

**JANVIER : MOIS DE SENSIBILISATION AU
CANCER DU COL DE L'UTÉRUS**



LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS EN AFRIQUE

Source : OMS : Plaidoyer pour la prévention et la lutte contre le
cancer du col de l'utérus en Afrique

Le cancer du col de l'utérus



Le cancer du col de l'utérus est le plus fréquent et représente la première cause de mortalité par cancer chez les femmes en Afrique.

Le cancer du col de l'utérus



En Afrique subsaharienne, selon l'Organisation Mondiale de la Santé, 34,8 nouveaux cas de cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes sont détectés chaque année, et 22,5 femmes pour 100 000 meurent de la maladie.

Le cancer du col de l'utérus



On estime que plus de 266 000 femmes meurent chaque année d'un cancer du col de l'utérus, et 87 % de ces décès se produisent dans les régions les moins développées du monde à l'instar de la Région africaine de l'OMS.

Le cancer du col de l'utérus



Cette pathologie inflige un fardeau économique et social considérable qui affecte directement l'Afrique. Si rien n'est fait, le nombre de décès atteindra 416 000 en 2035.

Le cancer du col de l'utérus



Le principal facteur de risque du cancer du col de l'utérus est l'exposition au papillomavirus humain (HPV). Il se transmet par contact avec les muqueuses, généralement par voie sexuelle. Bien que le préservatif limite le contact avec le virus, il ne permet cependant pas d'obtenir une protection complète.

Le cancer du col de l'utérus



Les autres facteurs de risques sont :
Plusieurs partenaires sexuels
; précocité des rapports sexuels ;
Tabagisme ;
contraceptifs hormonaux ; infection
au VIH , ou infection sexuellement
transmissible (chlamydie, herpes) ;
Plusieurs grossesses.

DEVANT QUELS SIGNES ALLEZ CONSULTER ?

SYMPTÔMES DU CANCER DU COL DE L'UTÉRUS



1

SAIGNEMENTS EN DEHORS DES RÈGLES
(MÉTRORRAGIES)

2

SAIGNEMENTS LORS DES RAPPORTS SEXUELS

3

LEUCORRHEE NAUSÉABOND
(PERTE VAGINALE NAUSÉABOND)

4

DOULEURS LORS DES RAPPORTS SEXUELS

5

DOULEURS PELVIENNES

6

DOULEURS LOMBAIRES

CES SIGNES PEUVENT ORIENTER VERS LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

Le cancer du col de l'utérus



Le diagnostic de cancer du col de l'utérus repose sur la réalisation d'un examen clinique et gynécologique complété d'examens complémentaires et confirmer par un examen anatomopathologique.

Le cancer du col de l'utérus



La prise en charge d'un cancer du col de l'utérus est pluridisciplinaire et adaptée à chaque cas. Ainsi, le traitement repose sur la chirurgie, la radiothérapie et la chimiothérapie utilisées seules ou en association.

Le cancer du col de l'utérus



La prévention du cancer du col de l'utérus passe par le vaccin contre le papillomavirus pour toutes les jeunes filles âgées de 11 à 14 ans avant toutes activités sexuelles.

Le cancer du col de l'utérus



Il est recommandé de réaliser un frottis de dépistage du cancer du col de l'utérus chez toutes les femmes âgées de 25 à 65 ans. Ainsi, le premier frottis a généralement lieu autour des 25 ans, puis tous les 3 ans.